

# Vitaminthe

## ONTWORMPASTA

### ■ SAMENSTELLING

Bevat per ml orale pasta :

Niclosamide.....	240 mg
Oxibendazol.....	30 mg
Excipients.....	tot 1 ml

### ■ EIGENSCHAPPEN

VITAMINTHE is een oraal, breedspectrum anthelminticum in pastavorm voor honden en katten. Niclosamide is specifiek werkzaam tegen lintwormen en oxibendazol bestrijdt zowel volwassen als larvale stadia van spoelwormen, zweepwormen en haakwormen. De combinatie van beide werkzame bestanddelen in deze pasta, maakt VITAMINTHE geschikt voor toepassing bij honden en katten van alle leeftijden en kan worden toegediend aan dieren, die in de lactatie zijn.

### ■ INDICATIES

Infecties bij honden en katten van alle leeftijden met :

**Spoelwormen** :*Toxocara canis*, *Toxocara cati* en *Toxascaris leonina*.

**Zweepwormen** :*Trichuris vulpis*.

**Haakwormen** :*Ancylostoma caninum* en *A. tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*.

**Lintwormen** :*Dipylidium spp.* of *Taenia spp.*

### ■ VOORZORGEN

· Dracht : Tijdens de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het lichaam hiermee niet bereikt worden.

· Lintwormen (*Dipylidium caninum*) worden overgebracht door vlooiën. Herbesmetting wordt voorkomen door ook vlooiën optimaal te bestrijden, zowel het dier als de omgeving.

· In verband met mogelijke overgevoelighedsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden.

### ■ TOEDIENINGSWIJZE/DOSERING

VITAMINTHE dient in een éénmalige dosering achter op de tong van het dier te worden ingegeven. De benodigde hoeveelheid kan ook door wat voedsel gemengd worden.

### ■ ALGEMENE DOSERING

1 ml per 2 kg lichaamsgewicht, zie verpakking.

Voor het ontwormingsschema zie de achterzijde van deze bijsluiter.

### ■ ATTENTIE

In verband met het risico van uitspugen/braken kort na toediening, dient vermeden te worden dat dit kan gebeuren op tapijt of ander textiel. Indien dit toch gebeurt, dan zo spoedig mogelijk reinigen met uitsluitend schoon water zonder reinigingsmiddelen.

### ■ BEWARING/HOUDBAARHEID

1 jaar na productiedatum, mits bij kamertemperatuur (15-25 C) bewaard.

#### ■ VERPAKKING

Doosje met 1 injector 5 ml (1 doseerstreep = ml)

Doosje met 1 injector 10 ml (1 doseerstreep = 1 ml)

Doosje met 1 injector 25 ml (1 doseerstreep = 5 ml)

#### ■ DE WORMEN VAN HOND EN KAT

Onze huisdieren, de hond en de kat, kunnen besmet zijn met wormen.

We onderscheiden SPOELWORMEN en LINTWORMEN.

De SPOELWORMEN herkennen we aan de vermicelli-achtige vorm. De spoelworm (*Ascariden*) komt het meeste voor en is belangrijk om te bestrijden vanwege de schade die deze veroorzaakt in het lichaam en de extreme besmettelijkheid voor pups en in mindere mate voor kinderen.

Volwassen dieren hebben meestal weinig last van spoelwormen.

De eieren van spoelwormen kunnen buiten het lichaam jarenlang infectieus blijven. Na opname vindt er een trektocht plaats in het lichaam en komen de wormen in de darmen terecht, waar ze als volwassen wormen weer eieren produceren en een gedeelte gaat in een zgn. rustfase in het lichaam.

Ontwormen, ook tijdens de dracht, heeft op de wormen in de rustfase geen effect.

Bij drachtigheid worden de 'rustende' wormen weer geactiveerd en besmetten pups reeds in de baarmoeder! Pups en kittens worden na de geboorte via de moedermelk besmet. Vooral jonge dieren kunnen op deze wijze snel veel schade oplopen.

Haakwormen (*Ancylostomidae*) en Zweepwormen (*Trichurata*) komen in Nederland minder voor en dan voornamelijk in kennels en pensjons.

LINTWORMEN bij volwassen hond en kat in Nederland zijn meestal weinig schadelijk (*Dipylidium*) en worden overgebracht door vlooiën. Ze zijn te herkennen in de ontlasting of rond de anus van het huisdier als 'rijstekorreltjes' of 'maden'. Dit zijn wormsegmenten die loslaten en meestal met de ontlasting mee naar buiten komen. Een dier besmet zichzelf weer door het oplicken van besmette vlooiën.

#### VITAMINTHE ONTWORMINGSSCHEMA

Het ontwormingsschema komt overeen met het uniforme advies van de ESCCAP (The European Scientific Counsel Companion Animal Parasites: [www.esccap.org](http://www.esccap.org)).

Altijd alle honden en katten in huis tegelijk ontwormen.

**Drachtige dieren** Tijdens de drachtigheid is ontwormen niet zinvol, aangezien de larven in het lichaam hiermee niet bereikt worden.

**Lacterende dieren** Na de geboorte dient het moederdier tegelijk met de behandeling van de zogende pups of kittens ontwormd te worden.

**Pups** : Behandelen op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken.

Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden.

**Kittens** : Behandelen op een leeftijd van 3, 5, 7 en 9 weken.

Vervolgens maandelijks ontwormen tot ze een half jaar oud zijn. Daarna op 9 en 12 maanden.

**Alle andere honden en katten** Minimaal 4 keer per jaar ontwormen en indien wormen in ontlasting en/of braaksel waargenomen worden

Diergeneesmiddel  
REG NL 2896

Importeur : Virbac Nederland BV · Barneveld  
Fabrikant : Virbac Laboratories · 06516 Carros · France